

Kopf, Hals (C00-C14) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	3.628	72,1	51,3	45,0	34,6
1996-2000	4.409	73,3	52,3	44,9	34,1
2001-2005	4.518	74,9	54,5	46,2	33,5
2006-2010	5.177	76,5	56,7	49,1	37,6
2011-2015	5.643	77,5	57,7	49,9	-
2016-2018	3.555	79,6	61,1	-	-
Männer					
1991-1995	2.800	70,6	47,7	41,1	30,6
1996-2000	3.332	71,6	49,8	42,2	31,2
2001-2005	3.430	73,8	52,2	43,5	30,5
2006-2010	3.793	75,3	54,3	46,7	34,8
2011-2015	4.174	77,0	56,1	47,5	-
2016-2018	2.536	79,1	59,0	-	-
Frauen					
1991-1995	828	77,2	63,6	58,3	48,2
1996-2000	1.077	78,7	60,2	53,3	43,3
2001-2005	1.088	78,2	61,7	54,6	42,8
2006-2010	1.384	79,8	63,3	55,8	45,3
2011-2015	1.469	78,9	62,5	56,8	-
2016-2018	1.019	81,0	66,6	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.